

FIÈVRE JAUNE

► **Mode de transmission :** **piqûres de moustique**

Le virus de la fièvre jaune est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques. Il n'existe pas de transmission interhumaine directe.

► **Présentation de la maladie**

Les principaux symptômes sont : fièvre, frissons, douleurs musculaires, maux de tête, nausées, vomissements. Dans les formes graves, il apparaît une atteinte sévère du foie et du rein ainsi qu'un syndrome hémorragique.

► **Prise en charge de la maladie**

Il n'existe actuellement aucun médicament antiviral spécifique contre la fièvre jaune, mais des soins spécifiques pour traiter la déshydratation, l'insuffisance hépatique et rénale.

► **Prévention : vaccin/protection contre les piqûres de moustique**

Le **vaccin** se fait impérativement en centre de vaccination internationale et peut être réalisé à partir de l'âge de 9 mois. Il est obligatoire pour l'entrée dans certains pays et recommandé dans d'autres, en raison de la présence de la maladie sur le territoire. Il est contre indiqué chez la femme enceinte, allaitante (nourrisson de moins de 6 mois) et en cas de déficit immunitaire (pathologie spécifique ou traitement). En cas d'allergie à l'œuf, la vaccination se fait en milieu hospitalier.

Depuis juillet 2016, l'Organisation mondiale de la santé a prolongé « à vie » la validité du vaccin contre la fièvre jaune, qui était auparavant de 10 ans.

Un rappel reste tout de même recommandé dans certaines situations :

- > les enfants vaccinés avant l'âge de 2 ans : une seconde dose est recommandée à partir de l'âge de 6 ans ;
- > les femmes vaccinées pour la première fois en cours de grossesse : le rappel reste recommandé à 10 ans ;
- > les personnes vivant avec le VIH et les personnes immunodéprimées : le rappel reste recommandé à 10 ans ;
- > en cas d'épidémie signalée dans le pays visité : le rappel reste recommandé à 10 ans.

La **protection contre les piqûres de moustiques** permet de réduire le risque de contamination :

- > Utilisation des moustiquaires la nuit
- > Imprégnation des vêtements avec des répulsifs
- > Utilisation des répulsifs cutanés.

Ces mesures sont indispensables en compléments de la vaccination.

► **Plus d'informations**

solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/la-fievre-jaune

www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/yellow-fever

www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/fievre-jaune?emkfid=EMF-50482477411

